

CALCIFOLIN 15 capsule
Calcio folinato
capsule da mg 15, per uso orale

Medicinale equivalente

CATEGORIA FARMACOTERAPEUTICA

Farmaci antianemici

INDICAZIONI TERAPEUTICHE

Il Calcifolin trova utilità, come antidoto di dosi eccessive di antagonisti dell'acido folico e per controbattere gli effetti collaterali indotti da aminopterina e da metotressato. Il Calcifolin trova inoltre indicazione in tutte le forme anemiche da carenza di folati dovute ad aumentata richiesta, ridotta utilizzazione, insufficiente apporto dietetico di folati.

CONTROINDICAZIONI

Ipersensibilità verso uno dei componenti.

CALCIFOLIN non deve essere somministrato per il trattamento dell'anemia perniciosa o altre anemie megaloblastiche quando la vit. B₁₂ è carente, se non in associazione alla medesima.

PRECAUZIONI D'IMPIEGO

Il CALCIFOLIN, somministrato nell'anemia perniciosa o in altre anemie megaloblastiche conseguenti a carenza di vit. B₁₂ può determinare remissione ematologica lasciando inalterata la progressione delle lesioni neurologiche (vedere anche controindicazioni). In questi casi il prodotto deve essere associato ad appropriata terapia con vitamina B₁₂ ed il trattamento condotto sotto controllo ematologico e neurologico. Le anemie in gravidanza conseguenti all'aumentato fabbisogno di folati possono essere migliorate o normalizzate con somministrazioni di acido folinico.

Nel trattamento del superdosaggio da antagonisti dell'acido folico la somministrazione del Calcifolin deve essere effettuata possibilmente entro 1 ora, risultando generalmente inefficace una somministrazione dopo un periodo di 4 ore. La somministrazione del farmaco deve essere eseguita con attenzione in modo da evitare pericolo di reazioni allergiche od effetti collaterali.

INTERAZIONI CON ALTRI MEDICINALI E INTERAZIONI DI QUALSIASI ALTRO GENERE

L'acido folinico antagonizza gli effetti degli antifolici. Agisce come "rescue" (salvataggio) nella terapia con alte dosi di metotressato e come antidoto in caso di superdosaggio.

AVVERTENZE SPECIALI

Tenere il medicinale fuori della portata dei bambini.

DOSE, MODO E TEMPO DI SOMMINISTRAZIONE

- Nel trattamento delle anemie da carenza di folati la posologia è di 15-25 mg/die per 10-15 giorni.

